

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman perawat terhadap pelaksanaan Pelatihan PPI Dasar berdasarkan Faktor Predisposisi (*Predisposing*) dalam penelitian ini meliputi : jenis kelamin, tingkat pendidikan, umur, masa kerja, pengetahuan, dan sikap. Diketahui bahwa dari total 56 orang responden dengan tingkat pemahaman yang baik, persentase responden terbanyak adalah berasal dari tingkat pendidikan dengan jenjang pendidikan D3; 26 – 35 tahun ; jenis kelamin perempuan; masa kerja > 10 tahun; skor pengetahuan 100; dan dengan penilaian sikap “Sangat Sering”.
2. Pemahaman perawat terhadap pelaksanaan Pelatihan PPI Dasar berdasarkan Faktor Pemungkin (*Enabling*) dalam penelitian ini adalah pada variabel sarana prasarana. Pada variabel ini dari 54% responden dengan tingkat pemahaman yang baik, berpendapat bahwa sarana prasarana saat Pelatihan PPI Dasar telah mendukung dalam mendapatkan tujuan mereka yaitu pemahaman yang baik saat Pelatihan.
3. Pemahaman perawat terhadap pelaksanaan Pelatihan PPI Dasar berdasarkan Faktor Penguat (*Reinforcing*) dalam penelitian ini adalah pada variabel peran manajemen. Pada variabel ini 50% responden dengan tingkat pemahaman yang baik “Setuju” bahwa peran manajemen dalam pelaksanaan Pelatihan PPI Dasar telah baik dan mendukung mereka dalam mendapatkan pemahaman yang baik pula.
4. Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman perawat secara keseluruhan dalam pelaksanaan Pelatihan PPI Dasar yang telah diberikan RSUD Haji Surabaya pada tahun 2018 adalah, dari total 59 responden 95% diantaranya telah memiliki pemahaman yang baik. Sedangkan 3% responden memiliki

pemahaman yang cukup. Dan 2% sisanya memiliki pemahaman yang kurang. Dan berdasarkan hasil pengolahan SPSS secara keseluruhan variabel independen yang diteliti secara simultan (bersama – sama) berpengaruh terhadap variabel dependen sebesar 92,4% sedangkan 7,6% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## 6.2 Saran

1. Meskipun tingkat pemahaman pada 95% dari responden penelitian ini telah baik, namun akan lebih baik lagi bila Rumah Sakit tetap memberi kesempatan bagi para perawat lainnya yang belum mendapatkan pelatihan, khususnya pada Pelatihan PPI Dasar. Agar dapat mewujudkan pemerataan pemahaman materi pada pelatihan ini kepada seluruh perawat. Selain itu agar rumah sakit secara kuantitatif dapat memenuhi peraturan yang ada pada Kepmenkes 129 Tahun 2008 tentang SPM Rumah Sakit, bahwa SPM dari pelatihan PPI yang harus dipenuhi oleh Rumah Sakit adalah sebesar 75%.
2. Menggunakan perawat yang telah terlatih sebagai *trainer* bagi para perawat lainnya yang belum terlatih, dan menyediakan sertifikat atau sejenisnya sebagai bukti pelatihan bagi para perawat tersebut.
3. Mengadakan *retraining* (pelatihan kembali) bagi para perawat yang telah mengikuti pelatihan sejak lama. Untuk mengasah kembali pemahaman mereka terhadap materi pelatihan PPI Dasar.
4. Berdasarkan pembahasan pada faktor penguat yaitu pada variabel peran manajemen, terdapat nilai total skala terendah ialah mengenai pernyataan (P4) “Manajemen menyelenggarakan pelatihan sesuai jadwal yang ditetapkan”. Sehingga saran yang dapat peneliti beri ialah agar rumah sakit lebih mempersiapkan dan menyusun program pelatihan lebih terstruktur dan sesuai jadwal yang telah di tentukan dari awal. Agar memudahkan responden (perawat) dalam mengatur jadwal pekerjaan maupun kegiatan lainnya.