

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat digunakannya tracer disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Faktor *Man* yaitu pengetahuan petugas rekam medis masih kurang cukup, tingkat pendidikan yang belum memenuhi standar profesi, dan kurangnya pelatihan kepada petugas rekam medis.
2. Faktor *Material* yaitu belum tersedianya *tracer*. Bahan pembuatan tracer belum disediakan dan bahan tracer yang tidak efisien.
3. Faktor *Method*, yaitu tidak adanya SPO, ketidaksesuaian isi SPO dengan cara kerja petugas *filing*.

2.2 Saran

Mengingat faktor penghambat *tracer* yang masih banyak terjadi di pelayanan kesehatan, peneliti menyarankan beberapa saran untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Pimpinan pengelola rumah sakit sering memberikan pelatihan kepada petugas rekam medis terkait rekam medis khususnya tentang penggunaan *tracer* dalam peminjaman berkas rekam medis.
2. Pimpinan pengelola rumah sakit Perlu memberikan sosialisasi pengadaan penggunaan *tracer* pada peminjaman berkas rekam medis

3. Pimpinan pengelola rumah sakit perlu Memberikan sosialisasi kepada petugas *filling* mengenai pentingnya melakukan pengelolaan BRM sesuai protap/SPO yang ada.
4. Pimpinan pengelola rumah sakit perlu merencanakan pembuatan SPO penggunaan *tracer* rekam medis.
5. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan untuk lebih dalam lagi dengan melakukan penelitian terhadap beberapa faktor tambahan seperti faktor *Money* yaitu mengenai anggaran pendanaan sarana pendukung maupun hal-hal yang berkaitan dengan *tracer*