


BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian



Gambar 3. 1 Kerangka Konseptual

3.2 Penjelasan Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konseptual pada Gambar 3.1 di atas, penelitian yang dilakukan yaitu penelitian analitik, yaitu penelitian yang memiliki minimal 2

variabel. Dua variabel tersebut yaitu variabel independent (bebas/X) dan variabel dependen (terikat/Y). Yang menjadi variabel X yaitu pengisian RME berdasarkan identifikasi pasien, autentifikasi, laporan penting, dan pendokumentasian. Yang menjadi variabel Y yaitu perbedaan kelengkapan pengisian RME pada formulir assessment awal medis, CPPT, dan resume medis. Penilaian kelengkapan pengisian RME pada assessment awal medis, CPPT, dan resume medis menggunakan kategori lengkap dan tidak lengkap. Penilaian perbedaan kelengkapan pengisian RME menggunakan uji *Mann Whitney* untuk merumuskan hipotesis.

3.3 Uji Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual, maka uji hipotesis sebagai berikut:

1. H_0 = Tidak ada perbedaan kelengkapan pengisian RME pada formulir assessment awal medis rawat jalan dan rawat inap di RS TK.IV 05.07.03 Gubeng.
 H_{a1} = Ada perbedaan kelengkapan pengisian RME pada formulir assessment awal medis rawat jalan dan rawat inap di RS TK.IV 05.07.03 Gubeng.
2. H_0 = Tidak ada perbedaan kelengkapan pengisian RME pada formulir CPPT rawat jalan dan rawat inap di RS TK.IV 05.07.03 Gubeng.
 H_{a2} = Ada perbedaan kelengkapan pengisian RME pada formulir CPPT rawat jalan dan rawat inap di RS TK.IV 05.07.03 Gubeng.
3. H_0 = Tidak ada perbedaan kelengkapan pengisian RME pada formulir resume medis rawat jalan dan rawat inap di RS TK.IV 05.07.03 Gubeng.
 H_{a3} = Ada perbedaan kelengkapan pengisian RME pada formulir resume medis rawat jalan dan rawat inap di RS TK.IV 05.07.03 Gubeng.